이제는 말할 때

매독 및 선천성 매독

더 알아 보기:

www.aapca3.org/cs

QR 코드를 스캔하면 다른 언어를 사용할 수도 있습니다.

LIVE WELL SAN DIEGO

COUNTY OF SAN DIEGO
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

AAP-CA3
San Diego & Imperial Counties
INCORPORATED IN CALIFORNIA
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS - CALIFORNIA CHAPTER 3
American Academy of Pediatrics
DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN®

매독에 관하여

매독과 기타 성 매개 질환이 샌디에고 카운티에서 증가하고 있습니다. 매독은 박테리아에 의해 발생하는 성 매개 질환입니다. 선천성 매독은 임산부가 임신 또는 출산 중에 아기에게 매독을 감 염시키는 경우입니다. 매독은 심각한 조산, 유산, 사산(아기가 사 망한 태로 태어나는 것)을 초래할 수 있습니다. 또한 아기에게 심각한 선천적 결함을 일으킬 수 있습니다.

징후 및 증상

아무 증상도 느끼지 못하기 때문에 감염 사실을 모르는 사람이 많습니다. 다음은 매독의 징후입니다.

- 박테리아가 체내로 침투한 부위(질, 음경, 항문, 입술, 입) 주변의 염증
- 손바닥, 발바닥, 또는 겨드랑이 사이, 허벅지 상부의 발진

검사 및 치료

매독 감염을 여부를 확실하게 알 수 있는 유일한 방법은 간단한 혈액 검사 또는 우려되거나 의심스러운 염증의 체액 검사를 통해 검사를 받는 것입니다.
매독은 항생제로 쉽게 치료할 수 있습니다.
치료하지 않는다면 신체 장기를 손상시키고 섹스 파트너를 감염시킬 수 있습니다.
섹스 파트너가 임신한 경우에는 아기마저도 감염될 수 있습니다.
<u>우리 모두는 검사를 받고 섹스 파트너에게 매독을 옮기지 않을 책임이 있습니다.</u>

무료 검사 센터 찾기: gettested.cdc.gov

타인의 건강을 해칠 수도 있습니다

매독

및 기타 성 매개 질환은 아기에게 해를 끼칠 수 있습니다.

여성의 매독

- 여성의 매독이 샌디에고 카운티에서 증가하고 있습니다.
- 여성이 임신 중에 매독에 걸리면 기형아 출산, 유산, 조산, 사산으로 이어질 수 있습니다.
- 좋은 소식: 매독은 임신 중에도 항생제로 쉽게 치료할 수 있습니다.

임신 중인 경우

- 산전 관리는 산모와 아기의 건강 유지에 매우 중요합니다.
- 임신 중(임신 삼분기 초기(28-32주 사이))에 최소 2회의 매독 검사를 받아야 합니다. 일부 사람에게는 분만 시에도 검사를 권할 수 있습니다.
- 주치의가 없고 검사와 치료를 어디에서 받아야 하는지 알아보려면 2-1-1 San Diego로 전화하거나 www.STDSanDiego.org를 방문하시기 바랍니다.

지금의 발진이나 염증이

매독

매독과 기타 성 매개 질환이 샌디에고 카운티에서 증가하고 있습니다

매독 증상

- 첫번째 증상은 입, 생식기, 항문 부위의 내부나 주변에 나타나는 통증 없는 염증입니다.
- 두 번째 증상은 손바닥, 발바닥, 겨드랑이 사이, 허벅지 상부의 피부에 자주 나타나는 발진입니다.
  - 매독 증상은 나타났다가 사라질 수 있습니다.
  - 매독을 치료하려면 의학적 검사와 치료가 필요합니다.

아래에 해당한다면 지금 검사를 받으세요

- 징후나 증상이 있는 경우.
- 다른 성 매개 질환 검사를 받는 경우.
- 성 생활을 하는 경우(6-12개월마다 검사 권장)
- 콘돔 없이 성 생활을 하는 경우(6-12개월마다 검사 권장).
- 섹스 파트너가 두 명 이상인 경우(6개월마다 검사 권장).
- 다른 남성들과 성관계를 갖는 남성인 경우(3-6개월마다 검사 권장).
- 임신 중이거나 향후 임신을 계획하고 있는 경우.

LIVE WELL SAN DIEGO | COUNTY OF SAN DIEGO HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY | AAP-CA3 American Academy of Pediatrics

*QR 코드를 스캔하면 다른 언어를 사용할 수도 있습니다.

*로스앤젤레스 카운티 공중 보건부 자료를 수정함

검사 받기. 치료 받기. 널리 알리기.

비밀 검사 및 정보: www.STDSanDiego.org | STD.HHSA@sdcounty.ca.gov

자주 묻는 질문(FAQ)

선천성 매독(신생아 매독)

1. 선천성 매독이란 무엇입니까?

매독은 박테리아에 의해 발생하는 성 매개질환(STD)입니다. 매독은 쉽게 치료됩니다. 치료하지 않는다면 신체의 장기를 손상시킬 수 있습니다. 선천성 매독은 임산부가 임신 또는 출산 중에 아기에게 매독을 감염시키는 경우입니다. 매독은 심각한 조산, 유산, 사산(아기가 사망한 상태로 태어나는 것)을 초래할 수 있습니다. 또한 아기에게 심각한 선천적 결함을 일으킬 수 있습니다.

2. 매독은 어떻게 감염됩니까?

질 성교, 항문 성교, 구강 성교 중에 매독 종기나 돌기에 접촉하면 매독에 걸릴 수 있습니다. 이러한 종기나 돌기는 음경, 질, 항문, 입술, 또는 구강 내에서 발견할 수 있습니다. 위치에 따라서는 보이지 않을 수도 있으며 통증이 없는 경우가 많습니다. 또한 매독은 임신 중이나 분만 중에 아기에게 감염될 수 있습니다.

3. 매독은 어떤 증상이 있습니까?

아무 증상도 느끼지 못하기 때문에 감염 사실을 모르는 사람이 많습니다. 박테리아가 체내로 침투한 부위(질, 음경, 항문, 입술, 입) 주변의 염증, 또는 손바닥, 발 바닥, 겨드랑이 사이, 허벅지 상부의 발진은 매독의 징후일 수 있습니다. 매독 감염 여부를 확실하게 알 수 있는 유일한 방법은 검사를 받는 것입니다. 매독 검사는 산전 관리(임신 중 의료 관리)의 일상적인 부분입니다.

4. 검사는 언제 받아야 합니까?

임신 중 산전 관리는 산모와 아기의 건강을 보호하는데 매우 중요합니다. 임신 중에는 1) 첫 번째 산전 방문 시와 2) 임신 삼분기 초기(28-32주 사이)에 최소 2회의 매독 검사를 받아야 합니다. 의사는 분만 시 매독 검사를 한 번 더 받도록 권할수 있습니다

5. 매독은 어떻게 치료합니까?

매독은 임신 중에도 항생제로 치료할 수 있습니다. 매독 치료는 임산부가 받아도 안전합니다. 섹스 파트너도 검사와 치료를 받게 하십시오. 그렇게 하면 이들이 건강을 유지하고, 다른 사람을 감염시키지 않으며, 귀하를 다시 감염시키지 않을 수 있습니다. 매독에 한 번 걸렸더라도 다시 걸릴 수 있으므로 이렇게 하는 것이 중요합니다.

6. 어떻게 하면 매독을 예방할 수 있습니까?

콘돔을 사용하십시오.
임신 초기에 최대한 빨리 매독 검사와 치료 등 산전 관리를 받으십시오. 주치의가 없는 경우, 검사와 치료를 어디 에서 받아야 하는지 알아보려면 2-1-1 San Diego로 전화하거나 www.STDSanDiego.org를 방문하십시오.

핵심 사항:

- 선천성 매독은 임산부가 임신 또는 출산 중에 아기에게 매독을 감염시키는 경우입니다.
- 매독의 일반적인 증상에는 염증이나 발진이 포함되지만, 많은 사람들이 아무런 증상이 없습니다.
- 매독은 항생제로 쉽게 치료할 수 있으며 매독 치료는 임신 한 사람들도 안전하게 받을 수 있습니다.
- 산전 관리는 매독의 발견과 치료에 매우 중요합니다.

추가 정보:

www.aapca3.com/cs

*QR 코드를 스캔하면 다른 언어 를 사용할 수도 있습니다.

*로스앤젤레스 카운티 공중 보건부 자료를 수정함

LIVE WELL SAN DIEGO | COUNTY OF SAN DIEGO HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY | AAP-CA3 American Academy of Pediatrics