

IT'S THEIR HEALTH TOO

SYPHILIS

and other STDs can harm your baby

SYPHILIS IN WOMEN

- Syphilis in women is increasing in San Diego County.
- If a woman has syphilis while pregnant, it can lead to birth defects, miscarriage, premature birth, or stillbirth.
- Good News: Syphilis can be easily treated and cured with antibiotics, even during pregnancy.

IF YOU ARE PREGNANT

- Prenatal care is very important to keep you and your baby healthy.
- You should be tested for syphilis at least 2 times during your pregnancy (during the 1st trimester and early in the 3rd trimester, between 28-32 weeks). It may be recommended for some people to also get tested at delivery.
- Call 2-1-1 San Diego or visit www.STDSanDiego.org if you don't have a regular doctor and need to find out where to get tested and treated.



**Additional languages are available by scanning the QR code*

THAT RASH OR SORE MIGHT BE

SYPHILIS

Syphilis and other STDs are on the rise in San Diego County


SYPHILIS SYMPTOMS

- The first symptom is a painless sore that may appear inside or near the mouth, genitals, or anal area.
- A second symptom may be a rash that often appears on the palms of the hands, bottoms of the feet, or the skin between the armpits and upper thighs.
- Syphilis symptoms may appear and disappear.
- To cure syphilis, medical testing and treatment are required.

TEST TODAY

- If you are experiencing signs or symptoms.
- If you are getting tested for other STDs.
- If you are sexually active (testing recommended every 6-12 months).
- If you have sex without a condom (testing recommended every 6 months).
- If you have more than one sex partner (testing recommended every 6 months).
- If you are a man having sex with other men (testing recommended every 3-6 months).
- If you are pregnant or plan to get pregnant in the future.

**Adapted from Los Angeles County Department of Public Health*



GET TESTED. GET TREATED. SPREAD THE WORD.

For confidential testing or information: www.STDSanDiego.org | STD.HHSA@sdcounty.ca.gov

ES LA SALUD DE ELLOS TAMBIÉN

SÍFILIS

y otras ETS pueden lastimar a tu bebé

LA SÍFILIS EN LAS MUJERES

- La sífilis en las mujeres está aumentando en el Condado de San Diego.
- Si una mujer tiene sífilis mientras está embarazada, puede resultar en defectos de nacimiento (congénitos), aborto espontáneo, nacimiento prematuro, o muerte fetal (el bebé nace muerto).
- Buenas noticias: La sífilis se puede tratar y curar fácilmente con antibióticos, aun durante el embarazo.

SI ESTÁS EMBARAZADA

- La atención prenatal es muy importante para mantener saludables a ti y a tu bebé.
- Debes hacerte la prueba de sífilis por lo menos 2 veces durante tu embarazo (durante el 1^{er} trimestre y al inicio del 3^{er} trimestre, entre 28-32 semanas). Para algunas personas, se recomienda hacerse la prueba en el momento del parto.
- Llama al 2-1-1 San Diego o visita www.STDSanDiego.org si no tienes médico de cabecera y necesitas saber dónde hacerte la prueba y recibir tratamiento.



*Hay idiomas adicionales disponibles escaneando el código QR

ESE SARPULLIDO O LESIÓN PODRÍA SER

SÍFILIS

La sífilis y otras ETS están en aumento en el Condado de San Diego

SÍNTOMAS DE LA SÍFILIS

- El primer síntoma es una lesión sin dolor que puede aparecer dentro o cerca de la boca, los genitales, o en la región anal.
- Un segundo síntoma puede ser un sarpullido o erupción que frecuentemente aparece en la palma de las manos, la planta de los pies, o en las axilas y en el área de la ingle.
- Los síntomas de sífilis pueden aparecer y desaparecer.
- Para curar la sífilis, se requieren pruebas médicas y tratamiento.

HAZTE LA PRUEBA AHORA

- Si tienes signos o síntomas.
- Si te estás haciendo pruebas para otras ETS.
- Si eres una persona sexualmente activa (se recomienda hacerse la prueba cada 6-12 meses).
- Si tienes relaciones sexuales sin condón (se recomienda hacerse la prueba cada 6 meses).
- Si tienes más de una pareja sexual (se recomienda hacerse la prueba cada 6 meses).
- Si eres hombre y tienes relaciones sexuales con otros hombres (se recomienda hacerse la prueba cada 3-6 meses).
- Si estás embarazada o tienes planes de embarazarte en el futuro.

*Adaptado del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

HAZTE LA PRUEBA. RECIBE TRATAMIENTO. CORRE LA VOZ.

Para hacerte la prueba de manera confidencial o recibir información: www.STDSanDiego.org | STD.HHSA@sdcounty.ca.gov